

Maisons-Alfort, le 19/12/2022

## Conclusions de l'évaluation relatives à une demande d'extension d'usage majeur pour le produit PROPULSE, à base de prothioconazole et de fluopyrame de la société BAYER S.A.S.

*L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.*

*Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux.  
Le présent document ne constitue pas une décision.*

### PRESENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier, déposé par la société BAYER S.A.S., relatif à une demande d'extension d'usage majeur pour le produit PROPULSE (AMM<sup>1</sup> n° 2130202) pour un emploi par des utilisateurs professionnels.

Le produit PROPULSE est un fongicide à base de 125 g/L de prothioconazole<sup>2</sup> et de 125 g/L de fluopyrame<sup>3</sup> se présentant sous la forme d'une suspo-émulsion (SE), appliqué par pulvérisation. Les usages revendiqués (cultures et doses d'emploi annuelles) sont mentionnés en annexe 1.

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés de l'Agence du dossier déposé pour ce produit, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1107/2009<sup>4</sup>, de ses règlements d'application, de la réglementation nationale en vigueur et des documents guide.

Ce produit a été évalué par la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés dans le cadre de la procédure zonale pour l'ensemble des États membres de la zone Sud de l'Europe en tenant compte des usages pire-cas (principe du risque enveloppe<sup>5</sup>). Dans le cas où des mesures d'atténuation du risque sont proposées, elles sont adaptées aux usages revendiqués en France.

L'évaluation a donné lieu à la rédaction d'un « *Registration Report* » soumis à commentaire auprès des États membres et du demandeur avant finalisation et validation par la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés.

Les conclusions de l'évaluation ci-dessous se rapportent à la partie A du « *Registration Report* » (en langue anglaise). C'est une synthèse de la demande d'autorisation, des résultats de l'évaluation et des conditions de l'autorisation proposée, que l'Agence rend publique sur son site internet.

<sup>1</sup> Autorisation de Mise sur le Marché

<sup>2</sup> Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.

<sup>3</sup> Règlement d'exécution (UE) N° 802/2013 de la Commission du 22 août 2013 portant approbation de la substance active «fluopyrame», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission.

<sup>4</sup> Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

<sup>5</sup> SANCO document "risk envelope approach", European Commission (14 March 2011). Guidance document on the preparation and submission of dossiers for plant protection products according to the "risk envelope approach"; SANCO/11244/2011 rev. 5.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides lors de la soumission du dossier, soit au niveau européen (*Review Report* et conclusions de l'EFSA), soit par la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés. Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n°546/2011<sup>6</sup>. Lorsque des données complémentaires sont identifiées, celles-ci sont détaillées à la fin de la conclusion.

***Après évaluation de la demande, des commentaires des Etats membres de la zone Sud de l'Europe et avec l'accord d'un groupe d'experts du Comité d'experts spécialisé " Substances et produits phytopharmaceutiques, biocontrôle ", la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés émet les conclusions suivantes.***

## **SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION**

En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les conclusions de l'évaluation européenne des substances actives, sur les données soumises par le demandeur et évaluées dans le cadre de cette demande, sur les commentaires des Etats membres de la zone Sud de l'Europe-ainsi que sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés estime que :

- A.** Les caractéristiques physico-chimiques du produit PROPULSE ont été décrites et sont considérées comme conformes.

Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.

L'estimation de l'exposition, liée à l'utilisation du produit PROPULSE pour les usages revendiqués, est inférieure à l'AOEL<sup>7</sup> du prothioconazole et du fluopyrame pour les opérateurs<sup>8</sup>, les personnes présentes<sup>8</sup>, les résidents<sup>8,9</sup> et les travailleurs<sup>8</sup>, dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous. Cette exposition est supérieure à l'AOEL du desthio-prothioconazole pour les travailleurs pour les usages oignon (123% de l'AOEL) et porte graines – PPAMC (114% de l'AOEL) dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous. L'évaluation prend en compte les substances actives fluopyrame et prothioconazole ainsi que la conversion de cette dernière en desthio-prothioconazole (métabolite du prothioconazole) à un taux de 37% pour le maïs et 45% pour les autres cultures.

L'estimation des expositions cumulées aux substances actives fluopyrame, prothioconazole et au métabolite desthio-prothioconazole conduit à un IR<sup>10</sup> inférieur à 1 pour les opérateurs, les personnes présentes, les résidents<sup>9</sup> et les travailleurs pour l'usage maïs. En revanche cette estimation conduit à un IR supérieur à 1 pour les travailleurs, les résidents<sup>9</sup> enfants et les personnes présentes enfants pour les usages oignon, porte graines – PPAMC, porte graines général, et porte graines – betterave.

Les valeurs par défaut de DFR<sup>11</sup> et DT<sub>50</sub><sup>12</sup> ont été utilisées pour conduire cette évaluation selon la méthodologie en vigueur<sup>13</sup>, excepté pour l'usage maïs où un DFR affiné pour le

<sup>6</sup> Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

<sup>7</sup> AOEL : (Acceptable Operator Exposure Level ou niveau acceptable d'exposition pour l'opérateur) est la quantité maximale de substance active à laquelle l'opérateur peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé.

<sup>8</sup> Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

<sup>9</sup> L'estimation de l'exposition intègre une distance de 10 mètres à partir de la rampe de pulvérisation ainsi que l'utilisation d'un matériel permettant une atténuation de la dérive d'au moins 50 % (EFSA Journal 2014;12(10):3874).

<sup>10</sup> Indice de Risque qui estime le risque cumulé de l'ensemble des substances actives présentes dans le produit. Il est donc égal à la somme des Quotients de Risques spécifiques à chaque substance active prise indépendamment.

<sup>11</sup> DFR : Dislogeable Foliar Residue ou résidu foliaire à faible adhérence.

<sup>12</sup> DT<sub>50</sub> : Temps de dissipation foliaire à 50%

<sup>13</sup> EFSA Journal 2014;12(10):3874

desthio-prothioconazole a été utilisé sur la base de données fournies et jugées recevables. Pour les autres usages, l'évaluation affinée proposée par le demandeur s'appuie sur les valeurs de DFR et DT<sub>50</sub> issues d'études pour le desthio-prothioconazole qui n'ont pas été jugées acceptables, ces études ayant été conduites sur d'autres types de cultures que celles des usages revendiqués ou avec des produits différents.

Par ailleurs, les études d'affinement portant sur la réduction du pourcentage de la dérive fournies n'ont pas été considérées pertinentes car elles ne sont pas validées au niveau européen.

De plus, les valeurs d'absorption cutanée présentées dans le « *Registration Report* » pour le desthio-prothioconazole et le fluopyrame ne peuvent être retenues car les estimations proposées<sup>14</sup> sont basées sur des concentrations non représentatives des conditions d'utilisation.

Les niveaux de résidus mesurés et la distribution des résultats indiquent que, dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous, les usages maïs (grain uniquement), oignons et échalotes n'entraînent pas de dépassement des LMR<sup>15</sup> en vigueur pour le fluopyrame et le prothioconazole. L'usage maïs fourrager est susceptible d'entraîner un dépassement des LMR en vigueur dans les denrées d'origine animale pour le fluopyrame. L'usage ail est susceptible d'entraîner un dépassement de la LMR en vigueur pour le prothioconazole.

Les cultures porte graines n'étant pas destinées à l'alimentation humaine ou animale, l'évaluation de l'exposition du consommateur n'a pas été considérée nécessaire pour ces usages. Les sous-produits de ces productions ne devront toutefois pas être utilisés en alimentation humaine ou animale.

Les niveaux estimés des expositions aiguë et chronique pour le consommateur, liés à l'utilisation du fluopyrame et du prothioconazole contenus dans le produit PROPULSE, sont inférieurs respectivement à la dose de référence aiguë<sup>16</sup> et à la dose journalière admissible<sup>17</sup> des substances actives fluopyrame, prothioconazole et de ses métabolites<sup>18</sup>.

Les concentrations estimées dans les eaux souterraines en substance active et ses métabolites, liées à l'utilisation du produit PROPULSE, sont inférieures aux valeurs seuils définies dans le règlement (UE) n°546/2011 dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

Les niveaux d'exposition estimés pour les espèces non-cibles, terrestres et aquatiques, liés à l'utilisation du produit PROPULSE, sont inférieurs aux valeurs de toxicité de référence pour chaque groupe d'organismes, dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

- B.** Le niveau d'efficacité du produit PROPULSE est considéré comme acceptable pour les fusarioses sur maïs malgré un niveau d'efficacité faible. En effet, le prothioconazole, apporté par ce produit, permet la diminution des teneurs en mycotoxines produites par les fusarioses (notamment *Fusarium graminearum*). D'autre part, le fluopyrame n'ayant pas d'intérêt sur ces maladies, l'utilisation de ce

---

<sup>14</sup> Document guide du Panel EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus relatif à l'absorption cutanée (EFSA Journal 2017;15(6):4873).

<sup>15</sup> La limite maximale applicable aux résidus (LMR) est la concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, fixée conformément au règlement (CE) N°396/2005, sur la base des bonnes pratiques agricoles et de l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables.

<sup>16</sup> La dose de référence aiguë (ARfD) d'une substance chimique est la quantité estimée d'une substance présente dans les aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée sur une brève période, en général au cours d'un repas ou d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

<sup>17</sup> La dose journalière admissible (DJA) d'une substance chimique est une estimation de la quantité de substance active présente dans les aliments ou l'eau de boisson qui peut être ingérée tous les jours pendant la vie entière, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

<sup>18</sup> Peer review of the pesticide risk assessment for the triazole derivative metabolites in light of confirmatory data submitted, EFSA Journal 2018;16(7):5376.

produit n'est donc justifiée sur maïs qu'en présence d'un complexe de maladies (helminthosporiose / kabatiellose et fusariose).

Le niveau d'efficacité du produit PROPULSE est considéré comme satisfaisant pour la rouille sur ail. Pour *Botrytinia squamosa* sur oignons et échalote, le niveau d'efficacité du produit PROPULSE est limité, mais présente toutefois un intérêt agronomique pour lutter contre cette maladie.

Pour la stemphyliose sur oignon, ail et échalote, le niveau d'efficacité du produit PROPULSE est considéré comme insuffisant.

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009, une vérification de l'efficacité et de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur les cultures n'est pas nécessaire pour les usages mineurs sur cultures porte graines.

Le niveau de phytotoxicité du produit PROPULSE est considéré comme négligeable pour l'ensemble des usages revendiqués.

Les risques d'impact négatif sur le rendement, la qualité et la multiplication sont considérés comme négligeables.

Le risque d'impact négatif sur les cultures suivantes est considéré comme acceptable. Néanmoins, une attention particulière devra être portée sur les conditions d'installation des cultures suivantes. Un risque ne peut être exclu pour les graminées y compris les céréales en tant que cultures suivantes.

Le risque d'impact négatif sur les cultures adjacentes est considéré comme négligeable.

Il existe un risque de résistance vis-à-vis du prothioconazole pour la fusariose sur maïs (*Fusarium graminearum*), nécessitant la mise en place d'un monitoring.

## CONCLUSIONS

En résumé, la conformité ou l'absence de conformité aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011 est indiquée, usage par usage et sous réserve des conditions d'emploi décrites ci-après, dans le tableau suivant.

### I. Résultats de l'évaluation pour les usages revendiqués par le demandeur pour une autorisation de mise sur le marché du produit PROPULSE

Usage(s) (a)	Dose maximale d'emploi du produit	Nombre maximal d'applications (c)	Nombre maximal d'applications par culture	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR <sup>19</sup> )	Conclusion (b)
00120031 Maïs*Trt Part.Aer. *Fusarioses  <i>Portée d'usage : maïs</i>	1 L/ha	1	1	-	BBCH <sup>20</sup> 55-69	F	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center;">Non conforme sur maïs fourrager (LMR) (d)</div> <div style="padding: 2px; text-align: center;">Conforme sur maïs grain (d)</div>

<sup>19</sup> Le délai avant récolte (DAR) est le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte d'une culture ; ce délai peut être défini soit en jours, soit par le stade de développement de la culture lors de la dernière application (on parle alors de DAR F).

<sup>20</sup> BBCH : code universel décimal permettant d'identifier le stade de développement des cultures.

**Anses - dossier n° 2021-1313 – PROPULSE  
(AMM n° 2130202)**

Usage(s) (a)	Dose maximale d'emploi du produit	Nombre maximal d'applicatio ns (c)	Nombre maximal d'applicati ons par culture	Intervalle entre applicatio ns	Stade d'applicat ion	Délai avant récolte (DAR <sup>19</sup> )	Conclusion (b)
16053205 Oignon*Trt Part. Aer.*Maladies des taches brunes  <i>Cible : Stemphyliose</i>	0,8 L/ha	2	2	7 jours	BBCH 41- 47	7 jours	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs, efficacité)  <b>Non conforme sur ail (LMR)</b>
16803204 Oignon*Trt Part. Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses  <i>Cible : Botrytinia squamosa</i>  <i>Portée d'usage : oignon, échalote</i>	0,8 L/ha	2		7 jours	BBCH 41- 47	7 jours	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs)
16053201 Oignon*Trt Part. Aer.*Rouille(s)  <i>Portée d'usage : ail</i>	0,8 L/ha	2		7 jours	BBCH 41- 47	7 jours	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs)  <b>Non conforme (LMR)</b>
00606008 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part. Aer.*Phoma	0,8 L/ha	2	2	7 jours	BBCH 41- 85	N/A	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs) (d)
00606005 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part. Aer.* Rouille(s)	0,8 L/ha	2		7 jours	BBCH 41- 85	N/A	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs) (d)
00606004 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part. Aer.*Maladies à sclérotés	0,8 L/ha	2		7 jours	BBCH 41- 85	N/A	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs) (d)
10993214 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part. Aer.*Maladies des taches foliaires	0,8 L/ha	2		7 jours	BBCH 41- 85	N/A	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs) (d)

**Anses - dossier n° 2021-1313 – PROPULSE  
(AMM n° 2130202)**

Usage(s) (a)	Dose maximale d'emploi du produit	Nombre maximal d'applications (c)	Nombre maximal d'applications par culture	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR <sup>19</sup> )	Conclusion (b)
10993200 Porte graine*Trt Part.Aer.* Maladies diverses	0,8 L/ha	2	2	7 jours	BBCH 41-85	N/A	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs) (d)
00607005 Porte graine - Betterave industrielle et fourragère *Trt Part.Aer.* Maladies des taches foliaires	0,8 L/ha	2	2	7 jours	BBCH 31-85	N/A	<b>Non finalisée</b> (résidents enfants et personnes présentes enfants, travailleurs) (d)

Les lignes grisées dans le tableau signalent que l'évaluation conduit à identifier un risque ou que l'efficacité biologique n'a pas été démontrée ou bien qu'il n'a pas été possible de conclure avec les éléments disponibles. Dans la colonne « conclusion », est signalé le domaine de l'évaluation concerné.

(a) Arrêté du 12 avril 2021 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, JORF du 21 avril 2021.

(b) La conformité fait référence aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011. Sauf mention explicite, cette conformité porte sur la culture de référence définie dans le catalogue. La compatibilité des LMR des cultures rattachées par le catalogue a été vérifiée. L'évaluation est non finalisée en l'absence ou par manque de données satisfaisant les critères d'évaluation.

(c) Nombre d'applications pour un cycle cultural par an ou à une fréquence indiquée dans les conditions d'emploi et par parcelle.

(d) Application possible en période de floraison dans le cadre de l'application de l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

## II. Conditions d'emploi

Les conditions d'emploi précisées ci-dessous sont issues de l'évaluation et de mesures de prévention, pour chaque section du dossier pour laquelle l'usage revendiqué pourrait ainsi être considéré comme conforme. Il convient de les reprendre et/ou de les adapter au regard des usages qui seront effectivement accordés.

- **Pour l'opérateur**<sup>21</sup>, dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe, porter :

- **pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

- **pendant l'application**

*Si application avec tracteur avec cabine*

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

*Si application avec tracteur sans cabine*

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;

<sup>21</sup> Sur la base de l'estimation des expositions et des mesures de prévention des risques proposées par le demandeur et vérifiées par l'Anses. Certaines normes pouvant évoluer, il est de la responsabilité du demandeur de procéder à l'actualisation des références.

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.
  
- **Pour le travailleur**<sup>22</sup>, porter un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A).
  
- **SPe 2** : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit avant BBCH 41 pour les usages porte graine - PPAMC, florales et potagères et porte graine (sans précision), et avant BBCH 31 pour les usages porte graine - betterave industrielle et fourragère.
  
- **SPe 2** : Pour protéger les organismes aquatiques et les vers de terre et autres macro-organismes non-cibles du sol, ne pas appliquer ce produit avant BBCH 41 pour les usages porte graine - PPAMC, florales et potagères et porte graine (sans précision) et avant BBCH 31 pour les usages porte graine - betterave industrielle et fourragère.
  
- **SPe 3** : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée<sup>23</sup> de 5 mètres<sup>24</sup> comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages maïs et porte graine - Betterave industrielle et fourragère.
  
- **Spe 3** : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages oignon, porte graine (sans précision) et porte graine - PPAMC, florales et potagères.
  
- **Limites maximales de résidus** : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union européenne<sup>25</sup>.
  
- **Délai(s) avant récolte** :
  - o Maïs (grain uniquement) : F – la dernière application doit être effectuée au plus tard au stade BBCH 69 ;
  - o Oignons et échalotes : 7 jours ;
  - o Porte graines : non applicable.
  
- **Autres conditions d'emploi** :
  - o Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte graines traitées en alimentation humaine ou animale.

Les autres conditions d'emploi préconisées dans les précédentes évaluations réalisées ne sont pas modifiées.

### **Commentaires sur les préconisations agronomiques**

Un risque ne peut être exclu pour les graminées y compris les céréales en tant que cultures suivantes.

---

<sup>22</sup> Sur la base de l'estimation des expositions et des mesures de prévention des risques proposées par le demandeur et vérifiées par l'Anses. Certaines normes pouvant évoluer, il est de la responsabilité du demandeur de procéder à l'actualisation des références.

<sup>23</sup> Une zone non traitée (ZNT) est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau et ne pouvant recevoir aucune application directe.

<sup>24</sup> En cohérence avec l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2019.

<sup>25</sup> Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JOUE du 16/03/2005) et règlements modifiant ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I.

**III. Données de surveillance**

Il conviendrait de mettre en place un monitoring de la résistance au prothioconazole (un seul suivi tous produits confondus) pour la fusariose du maïs (*Fusarium graminearum*) et de fournir, lors de la demande du renouvellement d'autorisation du produit, un bilan des résultats de la surveillance mise en place.

Pour le directeur général, par délégation,  
le directeur,  
Direction de l'évaluation des produits réglementés

**Anses - dossier n° 2021-1313 – PROPULSE  
(AMM n° 2130202)**

**Annexe 1**

**Usage(s) revendiqué(s) par le demandeur pour une autorisation de mise sur le marché  
du produit PROPULSE**

Substance(s) active(s)	Composition du produit	Dose(s) maximale(s) de substance active
Prothioconazole	125 g/L	125 g sa/ha
Fluopyrame	125 g/L	125 g sa/ha

Usage(s)	Dose d'emploi du produit	Nombre d'applications	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR)
00120031 Maïs*Trt Part.Aer.* Fusarioses <i>Portée d'usage : maïs</i>	1 L/ha	1	-	BBCH 55-69	BBCH 69
16053205 Oignon*Trt Part.Aer.* Maladies des taches brunes	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 41-47	7 jours
16803204 Oignon*Trt Part.Aer.* Pourriture grise et sclérotinioses <i>Portée d'usage : oignon, échalote</i>	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 41-47	7 jours
16053201 Oignon*Trt Part.Aer.* Rouille(s) <i>Portée d'usage : ail</i>	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 41-47	7 jours
00606008 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.* Phoma	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-85	N/A
00606005 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.* Rouille(s)	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-85	N/A
00606004 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.* Maladies à sclérotés	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-85	N/A
10993214 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.* Maladies des taches foliaires	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-85	N/A
10993200 Porte graine*Trt Part.Aer.* Maladies diverses	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-85	N/A
00607005 Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.* Maladies des taches foliaires	0,8 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-85	N/A