

## AVIS

**de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,  
de l'environnement et du travail  
relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché  
pour la préparation TARGET SC à base de métamitronne  
et ses préparations identiques TRADIAMETRON SC et STEF-METRON  
de la société AGRICHEM B.V. après approbation de la métamitronne  
au titre du règlement (CE) n°1107/2009**

*L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour mission l'évaluation des dossiers de produits phytopharmaceutiques. Les avis formulés par l'agence comprennent :*

- *L'évaluation des risques que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;*
- *L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;*
- *Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.*

### PRESENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier déposé par la société AGRICHEM B.V d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la préparation TARGET SC et ses préparations identiques STEF-METRON et TRADIAMETRON SC, après approbation de la métamitronne au titre du règlement (CE) n°1107/2009, pour laquelle, conformément au code rural et de la pêche maritime, l'avis de l'Anses est requis.

Le présent avis porte sur la préparation TARGET SC à base de métamitronne, destinée au désherbage des betteraves industrielles et fourragères.

Cet avis tient compte des dossiers de demandes de changement de composition (dossier n° 2012-1125 / 1147 et 2012-1173), de modification des informations déclarées (2012-1172 / 1145 / 1146) et d'AMM de la préparation identique METAFOL SC (2013-0575) qui ont été soumis conjointement. L'ensemble de ces dossiers permet de considérer la préparation TARGET SC comme la préparation de référence et les autres préparations comme ses préparations identiques.

Cet avis est fondé sur l'examen par l'Agence du dossier déposé pour cette préparation, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009<sup>1</sup> applicable à partir du 14 juin 2011 et dont les règlements d'exécution reprennent les annexes de la directive 91/414/CEE<sup>2</sup>.

Les préparations STEF-METRON (AMM n°9200142), TARGET SC (AMM n°2090028) et TRADIAMETRON SC (AMM n°2090027) disposaient d'une autorisation de mise sur le marché. En raison de l'approbation<sup>3</sup> de la substance active métamitronne au titre du règlement (CE) n°1107/2009, les risques liés à l'utilisation de cette préparation doivent être réévalués sur la base des points finaux de la substance active.

<sup>1</sup> Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

<sup>2</sup> Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 transposée en droit français par l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94/359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.

<sup>3</sup> Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances approuvées.

Ces préparations ont été évaluées par l'Anses dans le cadre de la procédure volontaire zonale pour l'ensemble des états-membres de la zone Sud, en tenant compte des usages pires cas (principe du risque enveloppe<sup>4</sup>). Dans le cas où des mesures d'atténuation du risque sont proposées, elles sont adaptées à l'usage revendiqué en France.

Un rapport d'évaluation a été préparé par la France conformément au règlement (CE) n° 1107/2009.

## **SYNTHESE DE L'EVALUATION**

Les données prises en compte sont celles qui ont été jugées valides, soit au niveau communautaire, soit par l'Anses. L'avis présente une synthèse des éléments scientifiques essentiels qui conduisent aux recommandations émises par l'Agence et n'a pas pour objet de retracer de façon exhaustive les travaux d'évaluation menés par l'Agence.

Les conclusions relatives à l'acceptabilité du risque dans cet avis se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n°546/2011<sup>5</sup>. Elles sont formulées en termes d' "acceptable" ou "inacceptable" en référence à ces critères.

Après consultation du Comité d'experts spécialisé "Produits phytopharmaceutiques : substances et préparations chimiques", réuni le 23 septembre 2014, et consultation de l'ensemble des états-membres de la zone Sud de l'Europe, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet l'avis suivant.

### **CONSIDERANT L'IDENTITE DE LA PREPARATION**

La préparation TARGET SC est un herbicide composé de 700 g/L de métamitronne (pureté minimale 99 %), se présentant sous la forme d'une suspension concentrée (SC), appliqué en pulvérisation. Les usages revendiqués (cultures et doses d'emploi annuelles) figurent à l'annexe 1.

### **CONSIDERANT LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET LES METHODES D'ANALYSE**

#### **• Spécifications**

Les spécifications de la substance active entrant dans la composition de la préparation TARGET SC permettent de caractériser cette substance active et sont conformes aux exigences réglementaires.

#### **• Propriétés physico-chimiques**

Les propriétés physiques et chimiques de la préparation TARGET SC ont été décrites et les données disponibles permettent de conclure que la préparation ne présente pas de propriétés explosive ni comburante. La préparation n'est pas hautement inflammable (point éclair supérieur à 75°C), ni auto-inflammable à température ambiante (température d'auto-inflammabilité : 475°C). Le pH d'une dilution aqueuse de la préparation à la concentration de 1 % est de 7 à 20°C.

Les études de stabilité au stockage [1 semaine à 0°C, 2 semaines à 54°C et 2 ans à température ambiante dans l'emballage (PEHD<sup>6</sup>)] permettent de considérer que la

<sup>4</sup> SANCO document "risk envelope approach", European Commission (14 March 2011). Guidance document on the preparation and submission of dossiers for plant protection products according to the "risk envelope approach"; SANCO/11244/2011 rev. 5.

<sup>5</sup> Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

<sup>6</sup> PEHD : Polyéthylène haute densité.

préparation est stable dans ces conditions. Toutefois, il est recommandé d'agiter énergiquement la préparation avant utilisation.

Les études montrent que la mousse formée lors de la dilution aux concentrations d'usage reste dans les limites acceptables.

Les résultats des tests de suspensibilité et de spontanéité de la dispersion de la substance active montrent que la préparation reste homogène et stable durant l'application dans les conditions testées.

Les caractéristiques techniques de la préparation permettent de s'assurer de la sécurité de son utilisation dans les conditions d'emploi préconisées [concentrations de 0,15 % à 3,75 % (v/v)]. Les études montrent que l'emballage (PEHD) est compatible avec la préparation.

#### ● Méthodes d'analyse

Les méthodes de détermination de la substance active dans la substance active technique, ainsi que la méthode d'analyse de la substance active dans la préparation, sont conformes aux exigences réglementaires. La préparation ne contenant pas d'impuretés déclarées pertinentes, aucune méthode d'analyse n'est donc nécessaire pour la détermination des impuretés dans la préparation.

Les méthodes d'analyse pour la détermination des résidus de la substance active dans les plantes et les différents milieux (sol, eau et air) soumises dans le dossier de la préparation, sont conformes aux exigences réglementaires. Il conviendra cependant de fournir en post-autorisation, une méthode de détermination de la métamitronne dans les denrées d'origine animale.

La substance active n'étant pas classée toxique (T) ou très toxique (T+), aucune méthode d'analyse n'est nécessaire dans les fluides biologiques.

Les limites de quantification (LQ) de la substance active, ainsi que son métabolite, dans les différents milieux sont les suivantes :

Substance active	Matrices	Composés analysés et Limites de quantification	
Métamitronne	Plantes (matrices riches en eau)	Métamitronne	0,010 mg/kg*
	Denrées d'origine animale	Métamitronne	Méthode validée conformément au guide SANCO 825/00 rev8.1 à fournir
	Sol	Métamitronne	0,02 mg/kg *
	Eau de boisson et de surface	Métamitronne	0,1 µg/L
	Air	Métamitronne	3,3 µg/m <sup>3</sup> *

*La LQ reportée est la plus faible s'il existe plusieurs méthodes validées pour une même matrice.*

*\* LQ issue des méthodes soumises dans le cadre de ce dossier.*

#### CONSIDERANT LES PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

La dose journalière admissible<sup>7</sup> (DJA) de la métamitronne, fixée lors de son approbation, est de **0,03 mg/kg p.c.<sup>8</sup>/j**. Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de toxicité par voie orale de 2 ans chez le chien.

<sup>7</sup> La dose journalière admissible (DJA) d'un produit chimique est une estimation de la quantité de substance active présente dans les aliments ou l'eau de boisson qui peut être ingérée tous les jours pendant la vie entière, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

<sup>8</sup> p.c. : poids corporel.

La dose de référence aiguë<sup>9</sup> (ARfD) de la métamitronne, fixée lors de son approbation, est de **0,1 mg/kg p.c.** Elle a été déterminée en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de toxicité du développement (tératogénèse) par voie orale chez le rat.

Les études réalisées avec la préparation TARGET SC (ancienne formulation) donnent les résultats suivants :

- DL<sub>50</sub><sup>10</sup> par voie orale chez le rat, égale à 2000 mg/kg p.c. ;
- DL<sub>50</sub> par voie cutanée chez le rat, supérieure à 2000 mg/kg p.c. ;
- Non irritant oculaire chez le lapin ;
- Non irritant cutané chez le lapin ;
- Non sensibilisant par voie cutanée chez le cobaye.

Aucune étude de toxicité par inhalation n'a été fournie. Toutefois, l'argumentaire soumis dans le cadre de ce dossier est jugée acceptable.

Ces études réalisées avec l'ancienne formulation sont jugés extrapolables à la nouvelle composition de la préparation TARGET SC (dossier n°2012-1125). Cependant, en raison de la présence de *benzisothiazolinone*, et en l'absence d'une étude de sensibilisation réalisée avec la nouvelle formulation, la préparation est classée sensibilisante (R43).

La classification de la préparation, déterminée au regard de ces résultats expérimentaux, de la classification de la substance active et des formulants, ainsi que de leur teneur dans la préparation, figure à la fin de l'avis.

**CONSIDERANT LES DONNEES DE TOXICOVIGILANCE HUMAINE COLLECTEES PAR LE RESEAU PHYT'ATTITUDE DE LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE**

Un seul dossier d'imputabilité vraisemblable est enregistré dans la base Phyt'Attitude sur la période 1997-2012, mettant en cause une préparation à base de métamitronne. A noter cependant qu'il existe une co-exposition à une préparation contenant chloridazone et quinmerac, dont l'imputabilité dans la survenue des signes et symptômes a été jugée vraisemblable.

Il s'agissait d'un agriculteur ayant présenté des céphalées d'allure migraineuse, survenues au début de l'application des 2 préparations sur céréales, suivies ensuite d'un épisode diarrhéique unique, 3 heures plus tard.

L'application a été faite avec un pulvérisateur à jet projeté, attelé à un tracteur à cabine fermée mais non équipée de filtre. L'intéressé a préparé la bouillie et rempli le matériel servant à l'application. L'exposition a duré 3 heures en tout et à plusieurs reprises, pendant le traitement, il a dû sortir de la cabine. Il a pendant toutes les opérations porté des gants, des lunettes de protection et un demi-masque à cartouche filtrante P.

Les troubles ont guéri en 24 heures avec une automédication symptomatique adaptée et n'ont pas entraîné de consultation médicale. Il est à noter que l'intéressé est migraineux et que ces symptômes récidivent de manière systématique à chaque nouvelle exposition à des produits phytopharmaceutiques. Cette notion de récurrence à chaque nouvelle exposition est fortement en faveur d'une relation de cause à effet, mais à l'inverse, le fait que d'autres produits phytopharmaceutiques induisent les mêmes troubles ne plaide pas pour un mécanisme toxique spécifique. Il est fréquent que les crises migraineuses soient déclenchées par des stimuli spécifiques chez certains individus, en particulier par l'exposition à certaines substances odorantes. Quant à la diarrhée, elle est un signe d'accompagnement assez fréquent (3 à 5 % des cas) des crises migraineuses.

<sup>9</sup> La dose de référence aiguë (ARfD) d'un produit chimique est la quantité estimée d'une substance présente dans les aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée sur une brève période, en général au cours d'un repas ou d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

<sup>10</sup> DL<sub>50</sub> (dose létale) est une valeur statistique de la dose unique d'une substance/préparation dont l'administration orale provoque la mort de 50 % des animaux traités.

L'effet toxique direct semble peu probable. Toutefois, il faut noter que l'exposition à des substances odorantes reste un stimulus très déclencheur de crise migraineuse.

**CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A L'EXPOSITION DE L'OPERATEUR, DES PERSONNES PRESENTES ET DES TRAVAILLEURS**

Le niveau acceptable d'exposition pour l'opérateur<sup>11</sup> (AOEL) de la métamitronne, fixé lors de son approbation, est de **0,036 mg/kg p.c./j**. Il a été déterminé en appliquant un facteur de sécurité de 100 à la dose sans effet néfaste observé obtenue dans une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le chien.

**Absorption cutanée**

Les valeurs retenues pour l'absorption cutanée de la métamitronne dans la préparation TARGET SC sont de 3 % pour la préparation non diluée et 32 % pour la préparation diluée, déterminées à partir d'une étude *in vitro* sur peau humaine, réalisée sur une préparation comparable.

**Estimation de l'exposition de l'opérateur<sup>12</sup>**

Le pétitionnaire a effectué une estimation de l'exposition des opérateurs. Sur cette base, ainsi que dans le cadre de mesures de prévention des risques, il préconise aux opérateurs de porter :

- **pendant le mélange/chargement**
  - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
  - Combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
  - EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
  
- **pendant l'application**
  - Combinaison de travail cote en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup> avec traitement déperlant ;
  - Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

*Si application avec tracteur sans cabine:*

  - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique ; dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

*Si application avec tracteur avec cabine*

  - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;
  
- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**
  - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
  - Combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
  - EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

Ces préconisations correspondent à des vêtements et équipements de protection individuelle effectivement disponibles sur le marché, et dont le niveau de confort apparaît compatible avec leur port lors des phases d'activité mentionnées. En ce qui concerne leur adéquation avec le niveau de protection requis, les éléments pris en compte sont détaillés ci-dessous.

<sup>11</sup> AOEL : (Acceptable Operator Exposure Level ou niveau acceptable d'exposition pour l'opérateur) est la quantité maximale de substance active à laquelle l'opérateur peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé.

<sup>12</sup> Opérateur/applicateur : personne assurant le traitement phytopharmaceutique sur le terrain.

L'exposition systémique des opérateurs a été estimée par l'Anses à l'aide modèle BBA (German Operator Exposure Model<sup>13</sup>) en considérant les conditions d'application suivantes de la préparation TARGET SC :

Culture	Méthode d'application – équipement d'application	Dose maximale d'emploi (dose de substance active/ha)
Betteraves industrielles et fourragères	Pulvérisateur à rampe	<b>1 à 3 L/ha/application</b> (700 à 2100 g de métamitron/ha)

Les expositions estimées, exprimées en pourcentage de l'AOEL de la métamitron, sont les suivantes :

Méthode d'application – équipement et dose d'application	Équipement de protection individuelle (EPI)	% AOEL métamitron
Pulvérisateur à rampe <b>3 L/ha</b>	Avec port d'une combinaison de travail et gants pendant le mélange/chargement et application	152 %
Pulvérisateur à rampe <b>2 L/ha</b>	Avec port d'une combinaison de travail et gants pendant le mélange/chargement et application	102 %
Pulvérisateur à rampe <b>1,7 L/ha</b>	Avec port d'une combinaison de travail et gants pendant le mélange/chargement et application	86 %
Pulvérisateur à rampe <b>1 L/ha</b>	Avec port d'une combinaison de travail et gants pendant le mélange/chargement et application	51 %

L'estimation de l'exposition a été réalisée en prenant en compte le port d'une combinaison de travail et de gants par les opérateurs. Dans cette évaluation, un facteur de protection de 90 % a été pris en compte pour la combinaison de travail, en conformité avec les propositions de l'EFSA (EFSA, 2010<sup>14</sup> et projet EFSA, 2014). Ce facteur de protection est basé sur le résultat de différents essais terrain, en conditions réelles, revus récemment par l'EFSA. Par ailleurs, un facteur de protection de 90 ou 95 % pour les gants dédiés à la protection contre les substances chimiques a été utilisé.

Ces résultats montrent que l'exposition des opérateurs représente 86 % et 51 % de l'AOEL de la métamitron avec port d'une combinaison de travail et avec port de gants pendant le mélange/chargement et l'application pour les doses respectives de 1,7 L/ha et 1 L/ha.

Pour des doses d'application de 2 L/ha et 3 L/ha, l'exposition des opérateurs est supérieure à 100 % de l'AOEL de la métamitron avec port d'une combinaison de travail et avec port de gants.

Compte tenu de ces résultats, les risques sanitaires pour les opérateurs sont considérés comme acceptables lors de l'utilisation de la préparation TARGET SC pour le désherbage des betteraves industrielles et fourragères avec un pulvérisateur à rampe pour les doses de 1,7 L/ha et 1 L/ha par application, dans les conditions ci-dessus, préconisées par le pétitionnaire.

Il convient de souligner que la protection apportée par la combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % elle-même peut être améliorée par le traitement déperlant préconisé et que les recommandations complémentaires, en particulier le port d'un EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée pour les phases de mélange/chargement et de nettoyage, sont également de nature à réduire l'exposition.

<sup>13</sup> BBA German Operator Exposure Model ; modèle allemand pour la protection des opérateurs (Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Heft 277, Berlin 1992, en allemand).

<sup>14</sup> EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR); Scientific Opinion on Preparation of a Guidance Document on Pesticide Exposure Assessment for Workers, Operators, Bystanders and Residents. EFSA Journal 2010;8(2):1501. [65 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1501. Available online: www.efsa.europa.eu

### **Estimation de l'exposition des personnes présentes<sup>15</sup>**

L'exposition des personnes présentes à proximité des zones de pulvérisation en plein champ, réalisée à partir du modèle EUROPOEM II<sup>16</sup>, est estimée à 18,8 % de l'AOEL de la métamitronne, pour un adulte de 60 kg, situé à 7 mètres de la culture traitée et exposé pendant 5 minutes aux brumes de pulvérisation. Les risques sanitaires pour les personnes présentes lors de l'application de la préparation TARGET SC sont considérés comme acceptables.

### **Estimation de l'exposition des travailleurs<sup>17</sup>**

En raison de l'application de la préparation TARGET SC sur des cultures ne nécessitant pas l'intervention de travailleurs après le traitement, il n'a pas été jugé nécessaire d'évaluer l'exposition des travailleurs. En conséquence, il n'est pas attendu d'exposition des travailleurs.

Toutefois, et afin de mieux prendre en compte la prévention des risques, le notifiant propose les mesures suivantes pour les travailleurs amenés à effectuer des manipulations dans les parcelles traitées :

- Port de gants à usage unique en nitrile (ambidextre à épaisseur fine tolérés) ;
- Port de combinaison de type 5 ou 6.

### **CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES AUX RESIDUS ET A L'EXPOSITION DU CONSOMMATEUR**

Les données concernant les résidus, fournies dans le cadre de ce dossier, sont les mêmes que celles soumises pour l'approbation de la métamitronne. En complément de ces données, le dossier contient de nouvelles études mesurant les niveaux de résidus sur betteraves sucrières.

### **Contexte réglementaire**

#### **Définition du résidu**

D'un point de vue réglementaire, le résidu pour la surveillance et le contrôle est défini dans les plantes et dans les produits d'origine animale comme la métamitronne.

#### **Limites maximales applicables aux résidus**

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de la métamitronne sont fixées aujourd'hui par le règlement (CE) n° 149/2008.

### **Essais concernant les résidus dans les végétaux**

#### **Betteraves industrielles et fourragères**

Les bonnes pratiques agricoles critiques (BPAC) revendiquées pour le traitement des betteraves industrielles et fourragères sont de 1 application à la dose de 1400 g/ha de métamitronne, la dernière étant effectuée au stade BBCH 09 ou des applications fractionnées avec une dose maximum par application de 2100 g/ha de métamitronne et de 2800 g/ha de métamitronne par an, au plus tard au stade BBCH 39. Le délai avant récolte revendiqué est donc de type F<sup>18</sup>.

La betterave industrielle est considérée comme majeure dans le nord et le sud de l'Europe. La betterave fourragère est considérée comme une culture majeure uniquement dans le nord de l'Europe.

8 essais, mesurant les teneurs en résidus dans les racines et les feuilles de betteraves industrielles, ont été fournis dans le cadre du présent dossier (4 dans la zone Nord et 4 dans la zone Sud). Ils ont été conduits en respectant des BPA plus critiques (1 application à la dose de 3400 à 4180 g/ha, BBCH 37). Dans ces conditions, les niveaux de résidus mesurés dans les racines sont toujours inférieurs à la limite de quantification (LQ) des méthodes d'analyse utilisées, de 0,02 mg/kg au maximum, et le plus haut niveau de résidus mesuré dans les feuilles de 0,04 mg/kg.

<sup>15</sup> Personne présente : personne se trouvant à proximité d'un traitement phytopharmaceutique et potentiellement exposée à une dérive de pulvérisation.

<sup>16</sup> EUROPOEM II- Bystander Working group Report.00.

<sup>17</sup> Travailleur : toute personne intervenant sur une culture après un traitement phytopharmaceutique.

<sup>18</sup> DAR F: le délai avant récolte est lié au stade de la culture au moment de la dernière application, et n'est pas défini en nombre de jours.

Les niveaux de résidus mesurés dans les racines et la distribution des résultats confirment que les BPA revendiquées permettront de respecter la LMR en vigueur de 0,20 mg/kg.

Toutefois, les études de métabolisme disponibles sur la betterave permettent de soutenir uniquement un usage comprenant des applications réalisées jusqu'au stade BBCH 18.

Les lignes directrices européennes "Comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements"<sup>19</sup> autorisent une extrapolation des résultats obtenus sur betterave industrielle à la betterave fourragère.

#### **Délais d'emploi avant récolte:**

Betteraves industrielles et fourragères : F – la dernière application doit être effectuée au plus tard au stade « 8 feuilles étalées » (stade BBCH 18).

#### **Essais concernant les résidus dans les denrées d'origine animale**

En prenant en compte les données disponibles relatives aux résidus et celles liées aux usages revendiqués, le niveau de substance active ingéré par les animaux d'élevage, estimé par un calcul d'apport journalier maximal théorique, n'est pas modifié. Par conséquent, les usages revendiqués n'engendreront pas de dépassement des LMR définies dans les denrées d'origine animale.

Cependant, aucune donnée n'étant disponible pour confirmer l'absence de résidu dans les feuilles de betteraves après un échec cultural ou un éclaircissage, il est recommandé de ne pas nourrir les animaux avec les feuilles de betteraves après un échec cultural ou un éclaircissage.

#### **Essais concernant les résidus dans les cultures suivantes ou de remplacement**

Les études de rotations culturales réalisées après l'approbation de la métamitronne sont suffisantes pour conclure que l'utilisation de la préparation TARGET SC sur les usages revendiqués n'aboutira pas à la présence de résidus dans les cultures suivantes ou de remplacement.

#### **Essais concernant les résidus dans les denrées transformées**

En raison du faible niveau de résidus dans les denrées susceptibles d'être consommées par l'homme, des études sur les effets des transformations industrielles et des préparations domestiques sur la nature et le niveau des résidus ne sont pas nécessaires.

#### **Evaluation du risque pour le consommateur**

##### ***Définition du résidu***

Des études de métabolisme de la métamitronne dans les plantes en traitement foliaire (betterave sucrière) ont été réalisées pour l'approbation de la métamitronne. D'après ces études, le résidu pour l'évaluation du risque pour le consommateur est défini, dans les racines comme la métamitronne.

La définition du résidu dans les produits d'origine animale pour l'évaluation du risque pour le consommateur n'a pas été jugée nécessaire lors de l'approbation de la métamitronne.

##### ***Exposition du consommateur***

Le niveau d'exposition des différents groupes de consommateurs européens a été estimé en utilisant le modèle PRIMo Rev 2-0 (Pesticide Residue Intake Model) développé par l'EFSA.

Considérant les données relatives aux résidus évaluées dans le cadre de ce dossier les risques chronique et aigu pour le consommateur sont considérés comme acceptables.

---

<sup>19</sup> Commission of the European Communities, Directorate General for Health and Consumer Protection, working document Doc. 7525/VI/95-rev.8.



**CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES AU DEVENIR ET AU COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT**

Conformément aux exigences du règlement (CE) n°1107/2009, les données relatives au devenir et au comportement dans l'environnement concernent la substance active et ses produits de dégradation. Les données ci-dessous ont été générées dans le cadre de l'examen communautaire de la substance active métamitronne. Elles correspondent aux valeurs de référence utilisées comme données d'entrée des modèles permettant d'estimer les niveaux d'exposition attendus dans les différents milieux (sol, eaux souterraines et eaux de surface) suite à l'utilisation de la préparation TARGET SC pour les usages considérés.

**Devenir et comportement dans le sol**

**Voies de dégradation dans le sol**

En conditions contrôlées aérobies, les principaux processus de dissipation de la métamitronne dans les sols sont la formation de résidus non-extractibles qui atteignent 30 à 41 % de la radioactivité appliquée (RA) après 100 à 120 jours d'incubation et la minéralisation qui atteint 23 à 57 % de la RA après 100 à 120 jours d'incubation. La métamitronne est également dégradée en un métabolite majeur, la désamino-métamitronne, qui atteint un maximum de 17,1 % de la RA après 30 jours au laboratoire.

Une fraction non identifiée (M3) atteignant plus de 5 % de la RA sur 2 points de mesures consécutifs (maximum 5,8 % de la RA après 2 jours d'incubation) a également été détectée dans un sol. Le pétitionnaire a fourni en tant que donnée confirmative une nouvelle étude de dégradation conduite dans des conditions similaires à celles utilisées dans l'étude initiale dans laquelle la fraction M3 avait été détectée. Cette dernière n'étant pas observée dans la nouvelle étude, l'état membre rapporteur conclut qu'il n'est pas nécessaire de la prendre en compte dans l'évaluation des risques de contamination des eaux souterraines.

Aucune étude en conditions anaérobies n'est disponible dans le dossier européen. Néanmoins, compte tenu de la période d'application de la préparation, la dégradation en conditions anaérobies n'est pas considérée comme pertinente.

La photodégradation n'est pas considérée comme une voie majeure de dégradation dans le sol. Aucun photo-produit n'a été identifié.

**Vitesses de dissipation et concentrations prévisibles dans le sol (PECsol)**

Les valeurs de PECsol ont été calculées selon les recommandations du groupe FOCUS (1997)<sup>20</sup>. La métamitronne et le métabolite désamino-métamitronne ne sont pas considérés comme persistants au sens du règlement (UE) n°546/2011.

Seuls les paramètres utilisés pour calculer les PECsol nécessaires pour finaliser l'évaluation du risque pour les organismes terrestres sont présentés :

- pour la métamitronne :  $DT_{50}^{21} = 22$  jours (valeur maximale au champ, cinétique SFO<sup>22</sup>, n = 4) ;
- pour la désamino-métamitronne : pourcentage maximum mesuré de 17,1 % de la RA ;  $DT_{50} = 39,7$  jours (valeur maximale au champ, cinétique SFO, n = 4).

Les valeurs de PECsol couvrant les usages revendiqués sont présentées dans la section écotoxicologie.

**Transfert vers les eaux souterraines**

**Adsorption et mobilité**

Selon la classification de McCall<sup>23</sup>, la métamitronne et la désamino-métamitronne sont considérées comme fortement mobiles.

<sup>20</sup> FOCUS (1997) Soil persistence models and EU registration, Doc. 7617/VI/96, 29.2.97.

<sup>21</sup>  $DT_{50}$ : durée nécessaire à la dégradation de 50% de la quantité initiale de substance.

<sup>22</sup> SFO : déterminée selon une cinétique de 1<sup>er</sup> ordre simple (Simple First Order).

<sup>23</sup> McCall P.J., Laskowski D.A., Swann R.L., Dishburger H.J. (1981), Measurement of sorption coefficients of organic chemicals and their use in environmental fate analysis, In: Test protocols for environmental fate and movement of toxicants, Association of Official Analytical Chemists (AOAC), Arlington, Va., USA.

### **Concentrations prévisibles dans les eaux souterraines (PEC<sub>eso</sub>)**

Les conclusions de l'évaluation européenne pour l'approbation de la métamitronne recommandent de porter une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions avec des sols et/ou des conditions climatiques vulnérables. Ces conclusions recommandent également de mettre en place des mesures de gestion de risque là où elles sont appropriées.

Les risques de transfert de la métamitronne et de son métabolite désamino-métamitronne vers les eaux souterraines ont été évalués à l'aide des modèles FOCUS PELMO 4.4.3 et FOCUS PEARL 4.4.4, selon les recommandations du groupe FOCUS (2009)<sup>24</sup>. Les paramètres d'entrée suivants ont été utilisés pour la métamitronne et son métabolite désamino-métamitronne :

- Métamitronne : DT<sub>50</sub> = 19 jours (moyenne géométrique des valeurs au laboratoire normalisées à 20 °C et pF 2, SFO, n=27), K<sub>foc</sub><sup>25</sup> = 86,4 mL/g<sub>OC</sub>, 1/n<sup>26</sup> = 0,78 (médianes, n=15),
- Désamino-métamitronne : DT<sub>50</sub> = 30,5 jours (moyenne géométrique des valeurs au laboratoire normalisées à 20 °C et pF 2, cinétique SFO, n=9), K<sub>foc</sub> = 102,5 mL/g<sub>OC</sub>, 1/n = 0,78 (moyennes arithmétiques, n=4), fraction de formation cinétique de 0,5.

Sur la base des simulations proposées par le pétitionnaire et validées par l'Anses, les PEC<sub>eso</sub> calculées pour la métamitronne sont inférieures à la valeur réglementaire de 0,1 µg/L (valeur maximale de 0,001 µg/L) pour l'ensemble des scénarios européens.

Les PEC<sub>eso</sub> calculées pour le métabolite désamino-métamitronne sont supérieures à la valeur réglementaire de 0,1 µg/L pour un scénario (PEC<sub>gw</sub> maximale de valeur 0,143 µg/L). Le métabolite n'étant pas considéré comme pertinent au sens du document guide SANCO 221/2000<sup>27</sup>, le risque est considéré comme acceptable.

Aucun risque inacceptable de contamination des eaux souterraines n'est attendu suite à l'utilisation de la préparation TARGET SC pour les usages revendiqués.

### **Devenir et comportement dans les eaux de surface**

#### **Voies de dégradation dans l'eau et les systèmes eau-sédiments**

La métamitronne est rapidement dégradée par hydrolyse en milieu alcalin. Elle est considérée comme stable en milieu neutre et acide.

La photolyse est considérée comme une voie de dégradation significative de la métamitronne dans les systèmes aquatiques. Le principal produit de dégradation est la désamino-métamitronne, qui atteint un maximum de 92,4 % de la RA après 24 heures d'exposition continue à la lumière.

Le principal processus de dissipation de la métamitronne dans les systèmes eau-sédiment est sa dégradation en désamino-métamitronne (48 à 54 % de la RA dans la colonne d'eau et 23,5 à 27,5 % de la RA dans le sédiment après 58 jours d'incubation). Après 58 jours d'incubation, la métamitronne dans la colonne d'eau représente moins de 1 % de la RA. Son adsorption sur le sédiment est faible (9 à 13,5 % de la RA après 7 jours). Les résidus non-extractibles atteignent un maximum de 23 à 26 % de la RA après 100 jours d'incubation. La minéralisation est faible.

#### **Vitesse de dissipation et concentrations prévisibles dans les eaux de surface et les sédiments (PEC<sub>sw</sub> et PEC<sub>sed</sub>)**

Les valeurs de PEC<sub>sw</sub> prenant en compte la dérive, le drainage et le ruissellement pour la métamitronne et le métabolite désamino-métamitronne, ont été calculées à l'aide du modèle FOCUS Steps 1-2<sup>28</sup> (Step 1 et 2 ; pire cas) selon les recommandations du groupe FOCUS

<sup>24</sup> FOCUS (2009) "Assessing Potential for Movement of Active Substances and their Metabolites to Ground Water in the EU" Report of the FOCUS Ground Water Work Group, EC Document Reference Sanco/13144/2010 version 1, 604 pp.

<sup>25</sup> K<sub>foc</sub>: coefficient d'adsorption dans l'équation de Freundlich normalisé par la quantité de carbone organique du sol.

<sup>26</sup> 1/n: exposant dans l'équation de Freundlich.

<sup>27</sup> Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under Council directive 91/414/EEC. Sanco/221/2000-rev10-final, 25 February 2003.

<sup>28</sup> Surface water tool for exposure predictions – Version 2.1.

(2012)<sup>29</sup>. Pour affiner les valeurs d'exposition à la métamitronne, des simulations ont également été réalisées avec le modèle FOCUS Swash<sup>30</sup> (Step 3).

Seuls les paramètres utilisés pour le calcul des PEC<sub>sw</sub> qui permettent d'établir les mesures de gestion pour protéger les organismes aquatiques sont présentés ci-dessous pour la substance active :

- DT<sub>50</sub> (eau) = 1000 jours (valeur conservatrice proposée par le pétitionnaire).

Les valeurs de PEC<sub>sw</sub> issues des simulations proposées par le pétitionnaire et validées par l'Anses sont présentées dans la section écotoxicologie.

### Comportement dans l'air

Compte-tenu de sa pression de vapeur ( $7,4 \cdot 10^{-7}$  Pa à 25°C), la métamitronne présente un potentiel de volatilisation négligeable selon les critères définis par le document guide européen FOCUS AIR (2008). De plus, sa DT<sub>50</sub> dans l'air calculée selon la méthode d'Atkinson est de 19,8 heures. Le potentiel de transport atmosphérique sur de longues distances est donc considéré comme négligeable (FOCUS AIR, 2008).

### Suivi de la qualité de l'eau et de l'air

#### Qualité des eaux souterraines

Les données recensées dans la base de données ADES (portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) entre 2004 et 2013 concernant le suivi de la qualité des eaux souterraines montrent que 18 analyses sur un total de 23653 sont supérieures à la limite de quantification. Parmi ces 18 analyses, 2 dépassent 0,1 µg/L.

En ce qui concerne le suivi de la qualité des eaux superficielles, la base de données SOeS<sup>31</sup> indique que 2699 des 102974 analyses réalisées entre 2001 et 2011 sont supérieures à la limite de quantification. Parmi ces analyses quantifiées, aucune n'est supérieure à la PNEC<sup>32</sup> de la métamitronne.

#### Qualité de l'air

Depuis 2001, des programmes de surveillance initiés par différentes AASQA<sup>33</sup> (Anses 2010<sup>34</sup>) ont recherché la substance active métamitronne dans l'atmosphère. Les données actuellement disponibles montrent que cette substance n'est pas détectée (LD de 0,05 ng/m<sup>3</sup>).

Il convient de souligner que les données mesurées et recensées dans les banques nationales ADES et SOeS, et des différentes AASQA résultent d'un échantillonnage sur une période donnée. Elles présentent l'intérêt de mesures *in situ*, complémentaires des estimations réalisées dans le cadre réglementaire de l'évaluation *a priori*. Bien que les stratégies d'échantillonnage et les méthodes d'analyse puissent différer d'une série de mesures à une autre (et de celles préconisées dans le cadre de ce dossier), l'ensemble des données peuvent collectivement être indicatrices d'une tendance. L'interprétation de l'ensemble de ces données (mesurées et calculées) reste finalement difficile dans l'état actuel des connaissances et du fait de l'absence de normes et de lignes directrices.

<sup>29</sup> FOCUS (2012). "FOCUS Surface Water Scenarios in the EU Evaluation Process under 91/414/EEC". Report of the FOCUS Working Group on Surface Water Scenarios, EC Document Reference SANCO/4802/2001-rev.2. 245 pp.; 2001; updated version 2012.

<sup>30</sup> Surface water scenarios help – Version 3.1.

<sup>31</sup> SOeS: Service de l'Observation et des Statistiques.

<sup>32</sup> PNEC : Concentration sans effet prévisible dans l'environnement.

<sup>33</sup> AASQA : Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air.

<sup>34</sup> Anses (2010): Recommandations et perspectives pour une surveillance nationale de la contamination de l'air par les pesticides. Synthèse et recommandations du comité d'orientation et de prospective scientifique de l'observatoire des résidus de pesticides (ORP). Rapport scientifique. Octobre 2010.

**CONSIDERANT LES DONNEES D'ECOTOXICITE**

**Effets sur les oiseaux**

**Risques aigus et à long-terme pour des oiseaux**

L'évaluation des risques aigus et à long-terme pour les oiseaux a été réalisée selon les recommandations du document guide européen Risk Assessment for Birds and Mammals (EFSA, 2009)<sup>35</sup>, sur la base des données de toxicité de la substance active issues du dossier européen :

• **Métamitronne**

- pour une exposition aiguë, sur la DL<sub>50</sub> égale à 1302 mg/kg p.c. (étude de toxicité aiguë chez la caille japonaise) ;
- pour une exposition à court-terme, sur la DL<sub>50</sub> supérieure à 904 mg/kg p.c./j (étude de toxicité par voie alimentaire chez le colin de Virginie) ;
- pour une exposition à long-terme, sur la dose sans effet de 81,5 mg/kg p.c./j (étude de toxicité sur la reproduction chez le colin de Virginie).

Les rapports toxicité/exposition (TER<sup>36</sup>) ont été calculés, pour la substance active, conformément au règlement (CE) n°1107/2009, et comparés aux valeurs seuils proposées dans le règlement (UE) n°546/2011, de 10 pour le risque aigu et de 5 pour le risque à long-terme, pour la dose de préparation et l'usage revendiqué.

	Oiseaux	Usage	TER	TER affiné	Seuil d'acceptabilité du risque
<b>Exposition aiguë</b>	Insectivores	Betteraves	24-80,5	-	10
	Omnivores	Betteraves	25,8-35,6	-	
	Granivores	Betteraves	25,1	-	
<b>Exposition à long-terme</b>	Insectivores	Betteraves	6,3-26,2	-	5
	Omnivores	Betteraves	5,6-6,7	-	
	Granivores	Betteraves	5,4-6,4	-	

Les TER aigu et long-terme, calculés en première approche, en prenant en compte des niveaux de résidus standard dans les items alimentaires pour la substance active étant supérieurs aux valeurs seuils, les risques aigus et à long-terme sont acceptables pour les oiseaux pour les usages revendiqués.

**Risques d'empoisonnement secondaire liés à la bioaccumulation**

La substance active métamitronne ayant un faible potentiel de bioaccumulation ( $\log \text{Pow}^{37} < 3$ ), les risques d'empoisonnement secondaire sont considérés comme négligeables.

**Risques aigus liés à la consommation de l'eau de boisson**

Compte tenu des propriétés de la substance active et conformément au document guide (Efsa, 2009), l'évaluation des risques liés à l'eau de boisson contaminée lors de la pulvérisation n'est pas nécessaire.

Cependant, le notifiant a fourni des données et le risque d'empoisonnement des oiseaux via l'eau de boisson contaminée lors de la pulvérisation a été évalué pour la substance active métamitronne et est considéré comme acceptable (TERa=2016 et TERIt=126).

<sup>35</sup> European Food Safety Authority; Guidance Document on Risk Assessment for Birds & Mammals on request from EFSA. EFSA Journal 2009; 7(12):1438. doi:10.2903/j.efsa.2009.1438. Available online: [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu)

<sup>36</sup> Le TER est le rapport entre la valeur toxicologique (DL50, CL50, dose sans effet, dose la plus faible présentant un effet) et l'exposition estimée, exprimées dans la même unité. Ce rapport est comparé à un seuil défini dans le règlement (UE) n°546/2011 en deçà duquel la marge de sécurité n'est pas considérée comme suffisante pour que le risque soit acceptable.

<sup>37</sup> Log Pow : Logarithme décimal du coefficient de partage octanol/eau.

## Effets sur les mammifères

### **Risques aigus et à long-terme pour des mammifères**

L'évaluation des risques aigus et à long-terme pour les mammifères a été réalisée selon les recommandations du document guide européen Risk Assessment for Birds and Mammals (EFSA, 2009), sur la base des données de toxicité de la substance active issues du dossier européen :

- **Métamitronne**

- pour une exposition aiguë, sur la DL<sub>50</sub> égale à 644 mg/kg p.c. (étude de toxicité aiguë chez le rat) ;
- pour une exposition à long-terme, sur la dose sans effet de 36,4 mg/kg p.c./j (étude de toxicité sur la reproduction sur 2 générations chez le rat).

- **Préparation TARGET SC**

- pour une exposition aiguë, sur la DL<sub>50</sub> égale à 2000 mg préparation/kg p.c. (étude de toxicité aiguë chez le rat).

Les TER ont été calculés, pour la substance active, conformément au règlement (CE) n°1107/2009, et comparés aux valeurs seuils proposées dans le règlement (UE) n°546/2011, de 10 pour le risque aigu et de 5 pour le risque à long-terme, pour la dose de préparation et les usages revendiqués.

	Mammifères	Usage	TER	TER affiné	Seuil d'acceptabilité du risque
Exposition aiguë	Insectivores	Betteraves	40,4-59	-	10
	Herbivores	Betteraves	8,7-9,1	11,2-11,6	
	Omnivores	Betteraves	17,8-18,5	-	
	Granivores	Betteraves	21,3	-	
Exposition à long-terme	Insectivores	Betteraves	6,5-17,2	-	5
	Herbivores	Betteraves	1,9-2,3	6-11,9	
	Omnivores	Betteraves	3,5-5,7	5,3-7,3	

Une évaluation affinée a été nécessaire pour le risque aigu et à long-terme. Pour les mammifères herbivores et omnivores, une première étape d'affinement prenant en compte l'utilisation de mesures de résidus dans les végétaux, l'utilisation de données alimentaires du lièvre et de la souris comme espèces focales permet de conclure à des risques aigu et à long-terme acceptables suite à l'application de la préparation TARGET SC pour les usages revendiqués.

### **Risques d'empoisonnement secondaire liés à la bioaccumulation**

La substance active métamitronne ayant un faible potentiel de bioaccumulation ( $\log Pow < 3$ ), les risques d'empoisonnement secondaire sont considérés comme négligeables.

### **Risques aigus liés à la consommation de l'eau de boisson**

Compte tenu des propriétés de la substance active et conformément au document guide (Efsa, 2009), l'évaluation des risques liés à l'eau de boisson contaminée lors de la pulvérisation n'est pas nécessaire.

Cependant, le notifiant a fourni des données et le risque d'empoisonnement des mammifères via l'eau de boisson contaminée lors de la pulvérisation a été évalué pour la substance active métamitronne et est considéré comme acceptable (TERa=1911 et TERIt=108).

### Effets sur les organismes aquatiques

Les risques pour les organismes aquatiques ont été évalués sur la base des données des dossiers européens de la substance active métamitronne et de ses métabolites.

De plus, des données de toxicité de la préparation TARGET SC sont disponibles pour les invertébrés aquatiques ( $CE_{50}^{38}$  48h = 98,8 mg préparation/L) et les algues ( $CEb_{50}^{39}$  72h = 3,3 mg préparation/L ;  $CEr_{50}^{40}$  72h = 6,4 mg préparation/L, NOEC = 1,25 mg préparation/L). Ces données n'indiquent pas une toxicité de la préparation plus élevée que la toxicité théorique calculée sur la base de la toxicité aiguë de la substance active. De plus, des données sur les métabolites MHPC et desamino-metamitron montrent qu'ils sont moins toxiques que les composés parents. L'évaluation des risques est donc basée sur les données de toxicité de la substance active et selon les recommandations du document guide européen Sanco/3268/2001.

Les valeurs de TER ont été calculées sur la base des PEC déterminées à l'aide des outils FOCUSsw. Elles sont comparées aux valeurs seuils proposées dans le règlement (CE) n°546/2011, respectivement de 100 pour le risque aigu et de 10 pour le risque à long-terme, pour la dose de préparation et les usages revendiqués sur betteraves industrielles et fouragères.

Seules les valeurs les plus critiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Substance	Espèce	Endpoint [µg/L]	PECsw [µg/L]	TER <sub>LT</sub>	Seuil	Mesures de gestion nécessaires
Métamitronne	mésocosme	NOAEC=1120	160,3 (Step 3)	7	3*	ZNT = 5 mètres

\* seuil défini lors de l'évaluation européenne de la substance active métamitronne.

En conclusion, les risques pour les organismes aquatiques peuvent donc être considérés comme acceptables en considérant une zone non traitée d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

### Effets sur les abeilles

Les risques pour les abeilles ont été évalués selon les recommandations du document guide Sanco/10329/2002. L'évaluation du risque pour les abeilles est basée sur les données de toxicité aiguë par voie orale et par contact de la préparation TARGET SC et de la substance active (métamitronne :  $DL_{50}$ contact >100 µg sa/abeille et  $DL_{50}$ orale >97,2 µg sa/abeille ; préparation:  $DL_{50}$ contact >100 µg préparation/abeille et  $DL_{50}$  orale >94,8 µg sa/abeille).

Les risques pour les abeilles ont été évalués selon les recommandations du document guide Sanco/10329/2002. L'évaluation du risque pour les abeilles est basée sur les données de toxicité aiguë par voie orale et par contact de la préparation TARGET SC. Conformément au règlement (UE) n°545/2011<sup>41</sup>, les quotients de risque (HQ<sup>42</sup>) ont été calculés pour la dose maximale revendiquée pour la préparation.

Item	DL <sub>50</sub> contact	HQc	DL <sub>50</sub> orale	HQo	Seuil
TARGET SC	>100 µg sa/abeille	< 21	>94,8 µg sa/abeille	<22	50

Les valeurs de HQ par contact et par voie orale étant inférieures à la valeur seuil de 50 proposée dans le règlement (UE) n°546/2011, les risques pour les abeilles sont considérés comme acceptables.

<sup>38</sup>  $CE_{50}$  : concentration entraînant 50 % d'effets.

<sup>39</sup>  $CEb_{50}$  : concentration d'une substance produisant 50 % d'effet sur la biomasse algale.

<sup>40</sup>  $CEr_{50}$  : concentration d'une substance produisant 50 % d'effet sur la croissance algale.

<sup>41</sup> Règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques.

<sup>42</sup> HQ ou QH : quotient de risque (Hazard Quotient).

### Effets sur les arthropodes non-cibles autres que les abeilles

L'évaluation des risques pour les arthropodes non-cibles est basée sur des tests de laboratoire sur support inerte réalisés avec la préparation TARGET SC sur les deux espèces standard [*Aphidius rhopalosiphi* (LR<sub>50</sub><sup>43</sup>/ER<sub>50</sub><sup>44</sup> > 22,8 L préparation/ha) et *Typhlodromus pyri* (LR<sub>50</sub>/ER<sub>50</sub> > 7 L préparation/ha)]. Les valeurs de HQ en champ sont inférieures à la valeur seuil de 2, issue du document guide Escort 2, pour les usages revendiqués (HQ < 0,25 pour *A. rhopalosiphi* et < 0,8 pour *T. pyri*). Les risques en champ pour les arthropodes non-cibles sont donc acceptables pour les usages revendiqués

### Effets sur les vers de terre et autres macro-organismes non-cibles du sol

Les risques pour les vers de terre et les autres macro-organismes du sol ont été évalués selon les recommandations du document guide européen Sanco/10329/2002, sur la base des informations disponibles sur la substance active, ses métabolites et la préparation TARGET SC.

Les TER calculés en première approche étant supérieurs aux valeurs seuils (10 pour le risque aigu et 5 pour le risque à long terme) proposées dans le règlement (UE) n°546/2011, les risques aigu et à long-terme sont acceptables pour les usages revendiqués (cf tableau ci-dessous).

Composé	Exposition	Organisme	Toxicité [mg/kg soil]	PEC <sub>max</sub> [mg/kg soil]	TER <sub>A</sub> / TER <sub>LT</sub>	Seuil
TARGET SC	aiguë	<i>E. foetida</i>	LC <sub>50</sub> >1000	4,26	>234	10
	chronique		NOEC 64,5		15	5
Métamitron	aiguë		LC <sub>50</sub> 914	4,26	214	10
	chronique		NOEC 28		6,6	5
Desamino-metamitron	aiguë	LC <sub>50</sub> corrigée >500	0,7	>714	10	
Desamino-metamitron	chronique	<i>Folsomia candida</i>	NOEC 100	0,7	142	5

### Effets sur les microorganismes non-cibles du sol

Des essais de toxicité sur la respiration du sol et sur la minéralisation de l'azote d'une préparation à base de métamitron (700 g/L ; SC) (Effets < 25% à 25 L préparation/ha après 84 jours) sont disponibles. Les résultats de ces essais ne montrent pas d'effet significatif sur la minéralisation de l'azote et du carbone du sol à 8 fois les PEC maximales. Aucun effet néfaste sur la minéralisation de l'azote et du carbone du sol n'est donc attendu suite à l'application de la préparation TARGET SC pour les usages revendiqués.

### Effets sur d'autres organismes non-cibles (flore et faune) supposés être exposés à un risque

Des essais de toxicité de la préparation TARGET SC sur l'émergence des plantules et la vigueur végétative en conditions de laboratoire sur 10 espèces sont soumis dans le cadre de ce dossier. Les résultats indiquent que les espèces les plus sensibles sont le concombre (ER<sub>50</sub> = 622 g sa/ha) pour la vigueur végétative et la carotte (ER<sub>50</sub> = 1003 g sa/ha) pour l'émergence des plantules.

La comparaison des ER<sub>50</sub> basées sur les effets sur la biomasse des plantules avec les doses correspondant à la dérive de pulvérisation permet de conclure à des risques acceptables pour les plantes non-cibles (ER<sub>50</sub> > 5 fois la PEC forte = 96,95 g sa/ha).

<sup>43</sup> LR<sub>50</sub> : Letal rate 50, exprimé en g/ha (dose appliquée entraînant 50 % de mortalité).

<sup>44</sup> ER<sub>50</sub> : "Median emergence rate" : Taux d'émergence à 50 %

**CONSIDERANT LES DONNEES BIOLOGIQUES**

**Mode d'action**

La métamitronne appartient à la famille des triazinones. Elle agit par inhibition de la photosynthèse par blocage de la protéine D1 du photosystème II. La substance est principalement absorbée par les racines mais aussi par les feuilles. Elle a une migration importante pour la voie racinaire.

**Efficacité**

39 essais d'efficacité réalisés sur 5 campagnes (2004 à 2012) en Angleterre, aux Pays Bas, en France, en Italie, en Grèce et en Espagne ont été fournis afin de démontrer l'efficacité de la préparation TARGET SC appliquée en pré-levée ou post-levée.

La comparabilité de comportement entre les préparations TARGET SC et AGRICHEM METAMITRONE WG (dossier n° 2012-1090) a été établie sur la base des 9 essais réalisés en Angleterre et au Pays Bas. Ainsi les données d'efficacité de la préparation TARGET SC peuvent être assimilées à celles de la préparation AGRICHEM METAMITRONE WG.

A partir de 6 essais (Italie, Espagne et Grèce), l'efficacité de la préparation appliquée à la dose de 3 L/ha en pré-levée a été démontrée sur 6 adventices majeures de la betterave. Les données fournies sont suffisantes pour redémontrer l'intérêt de l'utilisation de la préparation TARGET SC en pré-levée, à la dose actuellement autorisée de 2 L/ha ou à la dose de 1,7 L/ha.

A partir de 6 autres essais (France), l'efficacité de la préparation appliquée à la dose de 4 L/ha en post-levée a été redémontrée sur 2 adventices majeures de la betterave.

Différents programmes d'applications ont été étudiés dans l'ensemble des essais : application en post-levée en fractionnement de la préparation TARGET SC seule à la dose de 1,5 à 1,7 L/ha ou à la dose de 1 L/ha en association avec différents herbicides, application de la préparation en programme pré-levée (1 application) post-levée (2 applications).

Ces résultats montrent que l'application en fractionnement permet d'obtenir un meilleur contrôle des adventices par rapport à l'application de la préparation seule à la dose de 4 L/ha. Ainsi l'efficacité de la préparation en fractionnement à une dose maximale de 1,7 L/ha par application, appliquée en post-levée, est démontrée, lorsque celle-ci est intégrée dans un programme classique de désherbage de la betterave.

L'efficacité de la préparation TARGET SC selon les conditions d'emploi revendiquées a été redémontrée.

**Phytotoxicité**

La phytotoxicité de la préparation TARGET SC a été étudiée dans 4 essais de sélectivité réalisés en France en 2004 et dans l'ensemble des essais d'efficacité.

Aucun symptôme de phytotoxicité n'a été observé tout au long de chaque essai suite à l'application de la préparation en pré-levée (dose de 3 L/ha) et en post-levée (dose de 4 L/ha) dans les 6 essais d'efficacité.

Des symptômes temporaires de phytotoxicité de faibles ampleurs ont été observés suite à l'application de la préparation en post-levée (dose de 4 ou 8 L/ha) en une application dans les 4 essais de sélectivité.

L'application multiple de la préparation à dose réduite (entre 0,5 L/ha et 1,7 L/ha), seule ou en association avec d'autres préparations herbicide dans les essais d'efficacité, a induit parfois des symptômes de phytotoxicité de faibles intensités.

Par conséquent, l'application de la préparation TARGET SC dans les conditions d'emploi revendiquées est considérée comme sélective de la culture de la betterave industrielle et fourragère.



### **Impact sur le rendement et la qualité**

Des mesures sur le rendement et la teneur en sucre ont été réalisées dans les 4 essais de sélectivité réalisées en post-levée. L'application unique de 4 et 8 L/ha de préparation TARGET SC dans 2 essais ou de 5 et 10 L/ha de préparation en fractionnement en post-levée dans 6 essais n'a pas eu d'impact négatif sur le rendement et sur la teneur en sucre. Ces données confirment la sélectivité de la préparation.

### **Impact sur les cultures suivantes**

Aucune donnée nouvelle donnée n'a été fournie. Les recommandations d'emploi fournies par le pétitionnaire : « *En cas d'échec au niveau du semis de betteraves et après une application, un nouveau semis de betteraves peut être réalisé sans délai et sans un labour du sol. Les cultures de maïs et de pommes de terre peuvent être semées ou plantées après un labour du sol (15 cm de profondeur) et dans un délai de 14 jours après l'application de la préparation.*

*Après l'utilisation de la préparation, toujours labourer (15 cm de profondeur) avant de ressemer. Après 4 mois, dans le cadre normal d'une rotation, des céréales d'hiver peuvent être semées ou toute autre culture peut être implantée au printemps suivant.* » sont considérées comme acceptables.

### **Impact sur les cultures adjacentes**

Un argumentaire a été fourni se basant sur les études en laboratoires fournies en partie écotoxicologique sur la vigueur végétative des plantes non cibles pour exclure le risque d'impact négatif sur les cultures adjacentes (se référer aux conditions d'emploi proposées en fin d'avis).

### **Apparition et développement de la résistance**

L'utilisation de la préparation TARGET SC sur betterave présente un risque faible d'apparition et de développement de la résistance chez les principales adventices cibles du fait de l'utilisation de la préparation en association avec d'autres préparations herbicides à mode d'action différents et du fait de l'alternance des substances actives dans les cultures entrant en rotation avec la betterave. Un suivi de l'apparition devra être notamment réalisé et le pétitionnaire devra informer les autorités de tout changement par rapport au contexte actuel de la résistance à la métamitronne.

## **CONCLUSIONS**

En se fondant sur les critères d'acceptabilité du risque définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les conclusions de l'évaluation communautaire de la substance active, sur les données soumises par le pétitionnaire et évaluées dans le cadre de cette demande, ainsi que sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail estime que :

- A.** Les caractéristiques physico-chimiques de la préparation TARGET SC ont été décrites et permettent de s'assurer de la sécurité de son utilisation dans les conditions d'emploi préconisées.

Les méthodes d'analyse disponibles sont considérées comme acceptables. Il conviendra cependant de fournir une méthode de détermination de la métamitronne dans les denrées d'origine animale.

Les risques sanitaires pour l'opérateur, liés à l'utilisation de la préparation TARGET SC sont considérés comme acceptables pour des applications fractionnées de 1,7 L/ha et dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous. Les risques sanitaires pour le travailleur et les personnes présentes sont considérés comme acceptables.

Les usages revendiqués n'entraîneront pas de dépassement des LMR en vigueur. Les risques chronique et aigu pour le consommateur liés à l'utilisation de la préparation TARGET SC sont considérés comme acceptables.

Les risques pour l'environnement, notamment les risques de contamination des eaux souterraines liés à l'utilisation de la préparation TARGET SC, sont considérés comme acceptables pour l'usage revendiqué.

Les risques pour les organismes aquatiques et terrestres liés à l'utilisation de la préparation TARGET SC sont considérés comme acceptables dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

- B.** Sur la base des données disponibles dans le cadre de ce dossier de réexamen, l'efficacité de la préparation TARGET SC peut être considérée comme satisfaisante pour l'usage revendiqué et pour des applications fractionnées à une dose maximale de 1,7 L/ha en post-lévé. La sélectivité de la préparation est considérée comme acceptable.

Le risque d'apparition ou de développement de résistance des adventices lié à l'utilisation de la préparation est considéré comme faible dans les conditions d'emploi préconisées. Un suivi de l'apparition devra être notamment réalisé et le pétitionnaire devra informer les autorités de tout changement par rapport au contexte actuel de la résistance à la métamitronne.

En conséquence, considérant l'ensemble des données disponibles, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis **favorable** pour l'autorisation de mise sur le marché de la préparation TARGET SC et ses préparations identiques STEF-METRON, TRADIAMETRON SC et METAFOL SC (dossier n°2013-0575), dans les conditions d'emploi décrites ci-dessous et en annexe 2.

#### **Classification de la substance active selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Substance active	Référence	Ancienne classification	Nouvelle classification	
			Catégorie	Code H
Métamitronne	Règlement (CE) n° 1272/2008 <sup>45</sup>	Xn, R22 N, R50	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4	H302 Nocif en cas d'ingestion
			Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1	H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

<sup>45</sup> Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

**Classification de la préparation TARGET SC et ses préparations identiques STEF-METRON, TRADIAMETRON SC et METAFOL SC selon la directive 99/45/CE et le règlement (CE) n° 1272/2008**

Ancienne classification <sup>46</sup>	Nouvelle classification <sup>47</sup>	
	Catégorie	Code H
Xn : Nocif N : Dangereux pour l'environnement  R22 : Nocif par ingestion R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4  Sensibilisation cutanée, catégorie 1  Dangers pour le milieu aquatique- Danger aigu, catégorie 1	H302 Nocif en cas d'ingestion  H317 Peut provoquer une allergie cutanée  EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité	Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur	

Délai de rentrée : 48 heures en cohérence avec l'arrêté du 12 septembre 2006.

**Conditions d'emploi selon le règlement (CE) n° 1107/2009**

- Pour l'opérateur, porter :
  - **pendant le mélange/chargement**
    - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
    - Combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
    - EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
  - **pendant l'application**
    - Combinaison de travail cote en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup> avec traitement déperlant ;
    - Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
    - Si application avec tracteur sans cabine*
      - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique ;
    - Si application avec tracteur avec cabine*
      - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique n'est nécessaire que lors d'interventions sur le matériel de pulvérisation et les gants doivent être stockés à l'extérieur de la cabine ;
  - **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**
    - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
    - Combinaison de travail tissée en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
    - EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.
- Pour le travailleur amené à intervenir sur les parcelles traitées, porter des gants à usage unique en nitrile (ambidextre à épaisseur fine tolérés) ; et une combinaison de type 5 ou 6.

<sup>46</sup> Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

<sup>47</sup> Nouvelle classification selon le règlement CLP (règlement CE n° 1272/2008 « classification, labelling and packaging ») applicable aux préparations à partir du 1<sup>er</sup> juin 2015.

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. /Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.].
- SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
- Limites maximales de résidus (LMR) : Se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union européenne<sup>48</sup>.
- Délai avant récolte (DAR) : Betteraves industrielles et fourragères : F – la dernière application doit être effectuée au plus tard au stade « 8 feuilles étalées » (stade BBCH 18).

### **Recommandations de l'Anses pour réduire les expositions**

Il convient de rappeler que l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.

En tout état de cause, le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

### **Commentaires sur les préconisations agronomiques figurant sur l'étiquette**

- Il est recommandé de ne pas nourrir les animaux avec les feuilles de betteraves après un échec cultural ou un éclaircissage.

### **Descriptions de l'emballage revendiqué**

Bidon en PEHD d'une contenance de 1 L, 5 L et 10 L.

### **Données post-autorisation**

Fournir dans un délai de 2 ans :

- une méthode de détermination de la métamitronne dans les denrées d'origine animale.

**Marc MORTUREUX**

**Mots-clés** : TARGET SC, STEF-METRON, TRDIAMETRON SC, métamitronne, herbicide, betteraves industrielles et fourragères, WG, PREX.

<sup>48</sup> Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JOCE du 16/03/2005) et règlements modifiant ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I.

**Annexe 1**

**Usages revendiqués pour une autorisation de mise sur le marché  
de la préparation TARGET SC (AMM n°2090028) et ses préparations identiques  
STEF-METRON (AMM n°9200142) et TRADIAMETRON SC (AMM n°2090027)**

Substance active	Composition de la préparation	Dose de substance active
Métamitronne	700 g/L	2800 g sa/ha/an

Usage	Dose maximale d'emploi (dose en substance active)	Nombre d'applications	Délai avant récolte ou stade d'application
15055911 Betteraves industrielles et fourragères * désherbage	<b>2 L/ha (pré-levée)</b> (1400 g/ha)	1	-
15055911 Betteraves industrielles et fourragères * désherbage	<b>4 L/ha/an (post-levée)</b> (2800 g/ha/an) (maximum 3 L/ha/application ; 2100 g/ha/ application)	Applications fractionnées	-

**Annexe 2**

**Usage proposé pour une autorisation de mise sur le marché  
de la préparation TARGET SC et ses préparations identiques  
STEF-METRON, TRADIAMETRON SC et METAFOL SC**

Usage	Dose maximale d'emploi (dose en substance active)	Nombre d'applications	Délai avant récolte ou stade d'application
15055911 Betteraves industrielles et fourragères * désherbage	<b><u>4 L/ha/an</u></b> (maximum 1,7 L/ha/application)  <u>Pré-levée</u> : dose maximum de 1,7 L/ha Ou <u>Post-levée</u> : en fractionnement	1 application  (fractionnement <sup>49</sup> possible)	F (au plus tard au stade BBCH 18)

<sup>49</sup> Le fractionnement d'une dose pleine consiste à appliquer successivement des doses réduites d'une préparation sur une courte période, sans dépasser la dose pleine.  
Le fractionnement est une pratique de désherbage visant à optimiser le contrôle des adventices en cas de flore particulière ou de levées successives. Le fractionnement est également applicable aux régulateurs de croissance des plantes afin d'optimiser l'action souhaitée.  
Le fractionnement n'est pas applicable dans le cas d'un risque de résistance avéré. En l'état actuel des connaissances des cas de résistance d'adventices, ce fractionnement n'est pas applicable sur céréales, aux herbicides inhibiteurs de l'enzyme ACCase (acétyl-coenzyme A carboxylase) et de l'enzyme ALS (Acétolactase synthétase), exception faite du contrôle des bromes.  
Cette possibilité de fractionner peut évoluer selon le développement des phénomènes de résistances des adventices.